

TARJETA RECORDATORIO PARA EL PACIENTE

- Recuerde que se le va realizar un ECG al inicio y se les va medir la presión arterial antes de la primera dosis de fingolimod.
- Recuerde que será necesario monitorizar su corazón por 6 o más horas después de la primera dosis de fingolimod, incluyendo el control del pulso y de la presión arterial cada hora. Los pacientes podrían ser monitorizados con un ECG continuo durante las primeras 6 horas. Necesitarán un ECG a las 6 horas y en algunas circunstancias la monitorización supondrá la pernoctación en un centro médico.
- Recuerde que es necesario llamar a su médico en caso de interrumpir el tratamiento ya que la monitorización de la primera dosis puede tener que repetirse dependiendo de la duración de la interrupción y el tiempo transcurrido desde el inicio del tratamiento con fingolimod.
- Recuerde que es necesario notificar inmediatamente al médico los síntomas que indican un ritmo cardíaco lento tales como mareo, vértigo, náuseas o palpitaciones, después de la primera dosis de fingolimod.
- Fingolimod no está recomendada en pacientes con enfermedad cardíaca o en aquellos pacientes que toman concomitantemente medicamentos que se sabe que disminuyen el ritmo cardíaco y por ello Usted debe informar a cualquier médico que visite que está en tratamiento con fingolimod.
- Recuerde que si presenta signos y síntomas de infecciones como fiebre, decaimiento general, tos, es necesario notificarlos inmediatamente a su médico durante el tratamiento con fingolimod y hasta dos meses después de su interrupción.
- Recuerde que es necesario notificar inmediatamente al médico cualquier síntoma de alteración visual durante el tratamiento con fingolimod y hasta dos meses después de finalizar el tratamiento.
- Recuerde que fingolimod puede causar daño al feto durante el embarazo si Usted recibe el tratamiento con fingolimod estando embarazada. Por ello las mujeres en edad fértil deben:
 - Realizarse una prueba de embarazo.
 - Estar utilizando un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con fingolimod y al menos durante los 2 meses después de la interrupción del tratamiento.
 - Notificar inmediatamente al médico cualquier embarazo (intencionado o no intencionado) durante el tratamiento con fingolimod y al menos durante los 2 meses después de la interrupción del tratamiento.
- Recuerde que será necesario que le realicen una prueba de la función hepática antes de iniciar el tratamiento y de la monitorización de la función hepática a los meses 1, 3, 6, 9 y 12 durante el tratamiento con fingolimod y posteriormente de forma periódica.

Ante cualquier inconveniente con el producto o información adicional puede contactarse con:

Argentina

-Sistema Nacional de Farmacovigilancia de la ANMAT:

<https://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia/notificanos/pacientes> ; ANMAT responde 0800-333-1234, o responde@anmat.gob.ar

-Laboratorio Varifarma: <https://varifarma.com.ar/farmacovigilancia>