

TARJETA RECORDATORIO DEL PACIENTE ESPECÍFICA de EMBARAZO

Antes de iniciar el tratamiento con Emulimod

Fingolimod puede dañar al feto. Antes de iniciar el tratamiento con fingolimod, su médico le informará sobre los riesgos para el feto y le explicará lo que debe hacer para evitar quedar embarazada mientras esté tomando fingolimod.

Su médico le pedirá que haga una prueba de embarazo para asegurarse de que no está embarazada antes de empezar el tratamiento.

Su médico le informará sobre la necesidad de utilizar métodos anticonceptivos eficaces mientras tome fingolimod y durante 2 meses después de interrumpirlo.

Hable con su médico sobre las opciones anticonceptivas más eficaces disponibles más adecuadas para usted.

Por favor, lea la Guía para pacientes/padres/cuidadores de Emulimod proporcionada por su médico.

Mientras esté tomando Emulimod

No debe quedar embarazada mientras esté tomando fingolimod y durante los 2 meses siguientes a la interrupción del tratamiento.

Debe utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y durante 2 meses después de interrumpirlo para evitar quedarse embarazada.

Su médico le pedirá que se repita las pruebas de embarazo a intervalos adecuados.

Su médico le aconsejará regularmente sobre los riesgos graves del fingolimod para el feto. Informe inmediatamente a su médico si queda embarazada o si desea quedar embarazada, ya que su médico considerará la posibilidad de interrumpir el tratamiento con fingolimod.

En caso de embarazo, su médico le proporcionará asesoramiento sobre los efectos nocivos del fingolimod para el feto y le interrumpirá el tratamiento con fingolimod.

Su médico la derivará a un obstetra para el control del embarazo.

Su médico puede informar al laboratorio Varifarma sobre su embarazo con el fin de controlar los resultados del embarazo en mujeres expuestas a fingolimod durante el embarazo.

Después de interrumpir el tratamiento con fingolimod

Informe a su médico inmediatamente si cree que su EM está empeorando (por ejemplo, debilidad o cambios visuales) o si nota algún síntoma nuevo después de interrumpir el tratamiento debido a un embarazo.

Es necesario utilizar métodos anticonceptivos eficaces durante los 2 meses siguientes a la interrupción del tratamiento con fingolimod, debido al tiempo que tarda el fingolimod en desaparecer del organismo.